

PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DO LAT DWÓCH

Schemat szczepień do 2 roku życia wg Programu Szczepień Ochronnych na rok 2026*			Przyjazna alternatywa DTaP-IPV-Hib-HBV [†]		Przyjazna alternatywa DTaP-IPV-Hib	
Wiek dziecka	Szczepienia obowiązkowe	Liczba iniekcji	Proponowany schemat z zastosowaniem szczepionki skojarzonej 6 w 1 [†]	Liczba iniekcji	Proponowany schemat z zastosowaniem szczepionki skojarzonej 5 w 1	Liczba iniekcji
w ciągu 24. godz. po urodzeniu	WZW B, gruźlica		WZW B, gruźlica		WZW B, gruźlica	
w 2. m.ż. (po ukończeniu 6 tygodnia życia)	blonica, tężec, krztusiec (DTP), WZW B, Hib, pneumokoki, rotawirusy		DTaP-IPV-Hib-HBV pneumokoki, rotawirusy		DTaP-IPV-Hib WZW B, pneumokoki, rotawirusy	
w 3. m.ż. (od ukończeniu 14 tygodnia życia dla alternatywy 6w1)	rotawirusy		DTaP-IPV-Hib-HBV pneumokoki, rotawirusy		DTaP-IPV-Hib pneumokoki, rotawirusy [‡]	
w 4. m.ż. (po ukończeniu 14 tygodnia życia – po 8 tygodniach od poprzedniego szczepienia) dla alternatywy 6w1	blonica, tężec, krztusiec (DTP), poliomyelitis (IPV) ^{**} , Hib, pneumokoki, rotawirusy [‡]					
w 4. m.ż. (po 4 tygodniach od drugiej dawki dla alternatywy 6w1)	(rotawirusy)		DTaP-IPV-Hib-HBV (rotawirusy)		DTaP-IPV-Hib (rotawirusy)	
w 5.-6. m.ż. (po 4 tygodniach od drugiej dawki dla alternatywy 6w1)	(rotawirusy)					
w 6. m.ż.	blonica, tężec, krztusiec (DTP), poliomyelitis (IPV), Hib		odra, świnka, różyczka, pneumokoki		odra, świnka, różyczka, pneumokoki	
w 7. m.ż.	WZW B ^{***}					
w 13.-15. m.ż.	odra, świnka, różyczka, pneumokoki ^{****}		DTaP-IPV-Hib-HBV		DTaP-IPV-Hib	
w 16.-18. m.ż.	blonica, tężec, krztusiec (DTP), poliomyelitis (IPV), Hib					
Bilans iniekcji		19	- 9	= 10	- 7	= 12

Objaśnienie skrótów: WZW B – szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; DTP – szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (pełnokomórkowa); Hib – szczepionka przeciw inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez *Haemophilus influenzae* typu b; IPV – inaktywowana szczepionka przeciw poliomyelitis; 6 w 1 – (DTaP-IPV-Hib-HBV) – szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa), poliomyelitis (inaktywowana) i *haemophilus influenzae* typ b; 5 w 1 – (DTaP-IPV-Hib) – szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa), poliomyelitis (inaktywowana) i *haemophilus influenzae* typ b; † – w przypadku zastosowania szczepionki o 3-dawkowym schemacie; ‡ – rotawirusy po 4 tygodniach od pierwszej dawki; * Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2025 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2026 (ostatni dostęp: grudzień 2025 r.); ** od ukończenia 12. tygodnia; *** od ukończenia 6. m.ż.; **** od ukończenia 12. m.ż., po upływie co najmniej 6 miesięcy od drugiej dawki. † Zgodnie z PSO na 2026 rok możliwe jest zastosowanie wariantu szczepień do 2 lat z użyciem szczepionki wysokoskojarzonej 6w1 (DTaP-IPV-Hib-HBV) w schemacie 2+1. W 2. miesiącu życia (pierwsza dawka szczepienia), w 3.-4. miesiącu życia (druga dawka szczepienia, po 8 tygodniach od pierwszej dawki), w 12. miesiącu życia (trzecia dawka szczepienia, po ukończeniu 11. miesiąca życia, co najmniej 6 miesięcy od ostatniej dawki).

Wariant szczepień do 2 lat z użyciem szczepionki wysokoskojarzonej 6w1 (DTaP-IPV-Hib-HBV) w schemacie 3+1 oraz 2+1 dla szczepienia przeciwko rotawirusom jest taki sam.



Chroń swoje dziecko i zapobiegaj chorobom dzięki szczepieniom!

sanofi